

Ruta

Hoces del río Pedro



1

Cómo llegar

A 105 Km. en el SO de Soria, en la Tierra de Ayllón soriana. Se accede desde Soria por N-122 hasta San Esteban de Gormaz donde se toma la Nacional 110 hasta casi el pueblo de Ayllón en Segovia. Antes de llegar a él, se coge la carretera que a la izquierda nos marca Tiernes. Cuevas de Ayllón y/o Ligos, pueden ser nuestros destinos. Por la Autovía de Burgos, desde Madrid se encuentra a 150 kilómetros.

Figura de Protección: No tiene ninguna figura de protección. Formaría parte de la red de IBAS (Áreas Importantes para las Aves en sus siglas en inglés) de la Sociedad Española de Ornitología, dentro del amplio espacio Tiernes-Caracena -IBA 076-.

Tipología: Hoces cársticas en medio de laderas con matorral mediterráneo y bosquetes jóvenes de encinas y sabinas. Buenos bosques de ribera.


Acceso: En vehículo propio.

Dificultad: Media. No hay sendas ni caminos en varios puntos de las hoces, por lo que los recorridos pueden verse mediatizados por dicha circunstancia.

Duración: Muy variable pues la visita puede prolongarse si elegimos un recorrido amplio de las diversas hoces. Aproximaciones puntuales pueden conllevar paseos en torno a la hora/dos horas.

Época de visita: La primavera es el mejor momento para recorrer estas hoces y valles.

Observaciones: Los caminos suelen estar en mal estado por lo que en época de lluvias deberemos extremar la precaución. También hay que extremar la precaución en días de caza del corzo -que por otra parte son todos los de la primavera-; ropa llamativa, vistosa, de colores -nada de ropa de camuflaje- lo mejor para moverse con seguridad, pues a las aves les va a dar un poco igual mientras nos comportemos de manera correcta sin andar cerca de los nidos, ni gritar, etc.



-  Ruta 1
-  Ruta en familia A
-  Itinerario a pie
-  Inicio Ruta
-  Ruta 2
-  Rutas en familia B
-  Itinerario en coche

Descripción e itinerarios

En el imaginario "nacionalista" soriano, el año 1833 es un mal año pues es ahí, cuando el ministro Javier de Burgos decide crear una división provincial más acorde con los tiempos y crea las provincias que, todavía hoy, siguen manteniendo los límites que él propuso. En dicha división, la provincia de Soria perdió muchos territorios al norte -Cameros- y al sur -Ducado de Medinaceli. A cambio, incorporó zonas de Burgos y Segovia. Precisamente esta zona de la antigua tierra de Ayllón pasó, sin que sepamos muy bien el porqué, a la provincia de Soria.

A la naturaleza, al encanto de estos parajes, le da igual esos temas. Aquí aparece una de las hoces más bonitas de estas caídas de los páramos del Sistema Ibérico hacia la depresión del Duero, todo ello entre sabinares, pequeños campos, encinares, lastras y preciosos bosquetes de chopos negros y álamos blancos y temblones en el fondo de esas hoces. Porque después de que el río Pedro atraviese la población de Cuevas de Ayllón y su entorno de areniscas rojas tan características de la gran plataforma al pie de la Sierra de Pela, llega a las calizas cretácicas de la pedriza de Ligos creando, una estructura geológica de las más hermosas que puedan observarse en Soria.

El río gira casi 90° en Ligos y abandona la dirección oeste que llevaba para encaminarse dirección norte, hacia el Duero, dirección que no abandonará. Antes, va a volver encajarse en unos pequeños cortados, una pequeña hoz que continua desde Ligos pero que ya se acentúa en terrenos de Torraño, en el molino del Vado o molino de Torraño como popularmente se le conoce.

Proponemos dos itinerarios, que pueden acortarse a conveniencia del usuario:

1 El primero partiría de Cuevas de Ayllón por un camino que sale paralelo al río por la margen izquierda. Aquí vamos a notar una de las características de la ribera del río Pedro en todo este sector y es que se hace bastante difícil andar por él, dado que buena parte de los caminos y sendas se han ido perdiendo. Solo si el río baja muy crecido desaconsejamos esta opción pues se hará imposible pasar por alguna zona. De esta manera

llegaremos, dado que apenas tendría un kilómetro de longitud, a situarnos en frente de los cortados de la pedriza de Ligos. Un camino que aparece en la margen izquierda permitirá subir por la ladera y salir hacia la carretera comarcal por donde podremos volver a Cuevas. Conviene pararse a mirar la pedriza cuando lleguemos al punto más alto pues, la vista, merece mucho la pena.

2 El segundo itinerario partiría desde Ligos, a través de un camino que va por encima del río, en la margen izquierda del mismo. Este camino nos llevará, en cuatro kilómetros aproximadamente, al molino de Torraño y tiene el atractivo de que atraviesa casi todos los hábitats de esta zona, entre ellos un pequeño páramo residual donde todavía aparece la alondra rícotí. Desde el molino podremos andar un poco por el fondo de la hoz, aunque llegaremos a un punto por el que ya no podremos pasar. Podríamos volver por el mismo camino que hemos traído o, jugando con dos coches, haber dejado uno en el camino que une Torraño con Torremocha de Ayllón, justo en el puente donde cruza el río Pedro.

Cuándo ver las aves

El **invierno** es una etapa dura en estos valles y páramos. Solo en el sector del sabinar que se adivina en la zona noeste, hacia Torremocha de Ayllón, hay más bullicio dada la buena provisión de frutillo que aporta a las aves invernales la sabina -o enebro, en soriano-. Buenos bandos de zorzales, mirlos, rabilargos y páridos se pueden observar aquí. En esta etapa también los buitres leonados y el búho real empiezan su periodo de cría.

Febrero es el mes en el que, algunos tímidos cambios se empiezan a notar en el ambiente con la aparición de algunas totovías en cualquiera de los bosques abiertos de la comarca, o de los aviones roqueros en los cortados. En el bosque de ribera del río los trepadores azules -colonizadores recientes- son de los más activos y escandalosos, aunque no faltan ni picos picapinos ni pitos reales.

Marzo ya sí que da el pistoletazo de salida a lo que va anticipando la primavera. Las aves invernales van abandonando la zona y van llegando otras, como los



Búho Real

Bubo bubo

verdecillos y los colirrojos tizones que en estas tierras se comportan como migradores parciales. Si hay un ave característica de los cortados es el alimocho. Tres parejas se distribuyen al menos por los distintos cortados y es en marzo cuando llegan, dejándose ver parados en los roquedos sin mayores problemas.

También estos cortados van siendo ocupados por aves que han ido de acá para allá en **otoño-invierno** pero que, ante la llamada de la reproducción, vuelven a ocupar agujeros y grietas: chovas y grajillas -sobre todo estas últimas- van siendo emperro, cada vez más escasas. Quizás el descenso de la cabaña ovina tenga que ver con esta rarefacción por otra parte observable en otros puntos de Soria. Los cuervos se enseñorean de las hoces y sirven de reclamo perfecto cuando localizan a algún ejemplar de águila real, pues la saña con la que persiguen

a las águilas es fácilmente reconocible. También algún halcón peregrino puede todavía verse, escaso, en las hoces.

¿Quedan más inquilinos por aparecer? Pues sí, quedan. Roqueros solitarios, gorriones chillones, palomas zuritas, cernícalos vulgares, roqueros rojos -estos quizás los últimos ya de todos. Es por eso por lo que estos cortados son un bullicio continuo en mayo y junio, cuando la reproducción de esas especies alcance su momento álgido.

Aun así, algunas especies como buitres y alimoches llegarán hasta **julio** y/o comienzos de **agosto** en esos momentos en los que los pollos salgan de los niños. El complemento de valles, campos y páramos es perfecto para tener jornadas espectaculares aquí. En los páramos -en concreto en el citado de Torraño- junto a la ricotf, hay collalba rubia, terrera común y bisbita campestre, escribano hortelano,



curruca tomillera y mirlona -ésta también en buen número en los sabinares-...

En la ribera del río Pedro, tendremos una sinfonía coral de muchas especies de aves que habrán llegado en esos meses: ruiseñores comunes, mosquiteros comunes, petirrojos, papamoscas grises, oropéndolas, alcaudones comunes y dor-sirrojos...

No sé si tendremos ganas de más, pero en el capítulo de rapaces tenemos aguilu-chos cenizos hacia los campos de Ligos y

Torraño, ratoneros y calzadas, algún fur-tivo gavián y para nada rara, aunque no común, alguna culebrera europea. Ya solo nos falta madrugar mucho o quedarnos alguna noche temprana para poder oír una especie rara por Soria: el chotacabras cuellirrojo, detectado en los últimos años por esta zona junto con el más abundan-te chotacabras gris. Los auillos también acompañaran nuestros oídos en esos momentos pues es una especie frecuente todavía en estas riberas.

Otros recorridos cercanos aptos para toda la familia

A Hoz de Viñas Viejas en Torremocha de Ayllón. En Torremocha de Ayllón se encuentra una pequeña hoz, muy accesible, aunque precisamente esa accesibilidad hace que tengamos que ser cuidadosos en época de cría para no fastidiar ni molestar demasiado con nuestra presencia. Cogemos un camino en buen estado que sale al este de Torremocha y que nos llevará hasta la carretera de Morcuera a Liceras.

A unos 2 kilómetros tendremos la pequeña hoz caliza a nuestra izquierda, camuflada entre sabinas de bastante tamaño: Barranco de Bocalavoz tal y como se conoce en la zona. La misma avifauna rupícola que hemos comentado en el capítulo principal, la tendremos aquí: buitres leonados, alimoche, chovas piquirrojas, roqueros, búho real...todo ello en apenas dos paredes grandes que son las que forman esta hoz, siempre seca, porque el arroyo del barranco de la Vega que lo forma no lleva agua ni en momentos muy lluviosos.

B Cañada Real Soriana Occidental. Esta Cañada Real aparece en todo su antiguo esplendor en el límite de la provincia de Soria y Segovia, conservando en este tramo todas sus características originales en cuanto a extensión y anchura. Son tierras del término municipal de Ayllón y la cañada se conserva como única vegetación natural entre tierras intensamente cultivadas. Ello hace que sirva de punto de refugio, alimentación y cría de algunas especies características de estos ambientes como alondras, calandrias, cogujadas, collalbas grises, pardillos, lavanderas boyeras...

La observación más interesante, aunque no sabemos por cuanto tiempo, será la de algún macho de sisón. Desde mediados de abril hasta finales de junio, los machos de sisón tenían sus cantaderos a lo largo de este tramo de cañada. Hace 2 años solo pudo verse uno ya. Una especie que está desapareciendo en estos últimos años delante de nuestros propios ojos.

ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS

[o]

Reproductores

Buitre leonado, águila real, alimoche, águila calzada, culebrera europea, gavilán, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, halcón peregrino, cernícalo común, perdiz común, sisón común, búho real, mochuelo común, abejaruco común, abubilla, terrera común, alondra ricotí, alondra común, totovía, avión roquero, bisbita arbóreo, bisbita campestre, collalba rubia, roquero rojo, roquero solitario, mosquitero papialbo, mosquitero común, trepador azul, alcaudón dorsirrojo, gorrión chillón, gorrión moruno.

[❄]

Invernantes

Aguilucho pálido, esmerejón, bisbita pratense, zorzal real, zorzal alirrojo.

[→]

Observaciones en paso

Mirlo capiblanco, acentor alpino.